



COLOPROCTOLOGIA
Y CIRUGIA GENERAL

FISTULA COLO-VAGINAL

Dr. Uriel Cruz Calderón

Coloproctología • Colonoscopia
Cirugía General • Hernias
Laparoscopia avanzada

¿Qué es la fistula colo-vaginal?

¿A qué se debe?

¿Cuáles son sus síntomas?


¿Cómo se diagnostica?

¿Cuál es su tratamiento?

¿Qué puede pasar si no me opero?

¿Qué es la fistula colo-vaginal?

Es un agujero anormal que comunica alguna parte del intestino grueso (colon o recto) con la vagina.



Se observa la comunicación entre el recto y la vagina (fístula)

¿A qué se debe?

Hay muchas causas, pero las más frecuentes son por: Histerectomía (cirugía para quitar el útero), desgarro vaginal durante el parto, divertículos de colon, cáncer cervico-uterino y radiaciones.

¿Cuáles son sus síntomas?


El síntoma principal es la salida de materia fecal y gases por la vagina, con la consecuente infección vaginal. Las pacientes no pueden controlar la salida de ésta materia fecal y tienen que utilizar pañales o bien, dejan de salir a la calle por vergüenza.

¿Cómo se diagnostica?

Se requiere una exploración cuidadosa por ano y vagina. Si el orificio no se identifica fácilmente es necesario solicitar una rectosigmoidoscopia flexible, un colon por enema y, quizá, otros estudios para evaluar los músculos que permiten la función del ano. En casos asociados a cáncer, se debe realizar una biopsia de la fístula para descartar que no haya cáncer. Si desea saber en qué consisten esos estudios, consulte la sección de [Estudios de Laboratorio y Gabinete](#).



Colon por enema: Se observan divertículos y la comunicación entre el colon y la vagina (flecha).



Colonoscopia: Se observa la luz intestinal normal (flecha negra) y el orificio de la fístula (flecha blanca).

¿Cuál es su tratamiento?

La cirugía es la única forma que existe de curar ésta enfermedad. El tipo de cirugía depende del sitio exacto donde se encuentre el orificio (tanto en la vagina como en el colon). En algunos casos se puede realizar una cirugía a través del ano y, en otros, a través del abdomen. Algunos pacientes necesitan una colostomía temporal para permitir que los tejidos “sanen” y tiempo después se realiza la restitución del intestino, otros pacientes necesitan una colostomía de por vida. Su médico le explicará cuál es el tipo de cirugía que usted requiere de acuerdo a su caso.

¿Qué puede pasar si no me opero?

Continuará con los síntomas todo el tiempo e infecciones vaginales cada vez más fuertes. No lo olvide, cualquier forma de tratamiento que se le proponga mejorará su calidad de vida.

Acuda a consulta con un médico especialista en Coloproctología y Cirugía General debidamente certificado para tener un diagnóstico de certeza y tratamiento apropiado.

